

Lotingsprocedure fase 3C


In geval van loting in fase 3C wordt gebruik gemaakt van een 'online randomisatie tool', welke bereikt kan worden via: <https://www.random.org/lists/>

Om te loten tussen patiënten wordt de nummering van patiënten, zoals gehanteerd in het document op de T-schijf waarin het triageteam de overwegingen en besluiten van die betreffende vergelijkingsronde vastlegt.


Om te loten worden de nummers van de patiënten waar tussen geloot wordt ingevoerd in de box <Part 1: Enter List Items> op de website. Hiervan dient een 'print screen' gemaakt te worden (zie voorbeeld 1.), alvorens de loting verricht wordt.

De loting wordt verricht door op de knop <Randomize> te drukken. Op de pagina die daarna verschijnt (zie voorbeeld 2.) is de uitkomst van de loting te vinden, waarbij de nummers van de patiënten weergegeven worden in een volgorde.

Het nummer dat bovenaan de lijst staat is het nummer van de patiënt die op de IC opgenomen zal worden. Er dient eveneens een 'print screen' gemaakt te worden van de uitslag. Beide 'print screens' dienen geplaatst te worden op het fase 3 document.



Voorbeeld 1.



Voorbeeld 2.

1. De nummers van patiënten waar tussen geloot wordt, worden ingevoerd in de box op de website.
2. Er wordt een printscreen gemaakt van de invoer.
3. De printscreen wordt opgeslagen op ... met als titel
4. De loting wordt verricht door op 'randomize' te drukken.
5. De uitkomst van de loting verschijnt.
6. Er wordt een printscreen gemaakt van de uitkomst.
7. De printscreen wordt opgeslagen op ... met als titel
8. Het nummer van de patiënt die bovenaan staat wordt opgenomen op de IC.
9. Beide printscreens worden gecopypaste op het fase 3 document.